



¹ Универзитет „Гоце Делчев“, Факултет за медицински науки, Студии по општа Стоматологија - Катедра по орална и максилофацијална хирургија и дентална имплантологија, Штип, Република Македонија

² ПЗУ „Дент Естет“ - Штип, Р.Македонија



Поставување на дентални импланти во постериорна мандибуларна регија - Приказ на случај

¹ Киро Папакоча, ¹Цена Димова, ²Гордана Папакоча, ³Влатко Филиповски, ¹Јулија Заркова, ¹Катерина Златаноска

ЦЕЛ- беше да се претстави ефективна можност за решавање на беззобоста и соодветно на тоа спречување на атрофијата на алвеоларниот гребен, конкретно во бочна мандибуларна регија, со помош на методата за коскена аугментација.

ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ- Пациент на возраст од 29 години кој се јавува на преглед и третман во нашата ординација. При клинички и рентген преглед на пациентот, се одлучува за екстракција на 36 на кој е дијагностицирано Parodontitis chr. periapicalis. После негова екстракција, направена е аугментација на истото место. После 6 месеци од екстракцијата, поставени се три дентални импланти, а после уште 4 месеци од оваа интервенција направена е протетска рехабилитација.

РЕЗУЛТАТИ- предностите кај добро зачуваниот алвеоларен гребен, се од огромно значење при поставување на имплантите и достигнување нивно бескомпромисно естетско и функционално решение, прават да овие процедури ги применуваме кај поголемиот број на наши пациенти.



ЗАКЛУЧОК- Губењето на забите, често резултира со повлекување како на меките така и на коскениот ткива, затоа зачувувањето на алвеоларниот гребен е од голема важност, се со цел да се обезбеди соодветна имплантолошка естетска реставрација. За да обезбедиме успешна импланто - протетска рехабилитација, хируршката интервенција е од особено значење и се наметнува како потреба за да обезбедиме соодветен алвеоларен гребен.