

**Математичко списание СИГМА
за учениците од средните училишта**

ISSN 1409-6803

UDC51(497.17)

СОПСТВЕНИК И ИЗДАВАЧ:

СОЈУЗ НА МАТЕМАТИЧАРИ НА МАКЕДОНИЈА

Првиот број на СИГМА е отпечатен во јануари 1979 година.

Излегува во четири броја во текот на една учебна година.

Цената на еден примерок е 90 денари.

Претплатата за четирите броја е 300 денари.

Претплатата и порачките можете да ги испратите на адреса:

Сојуз на математичарите на Македонија

Бул. Александар Македонски б.б. Скопје П.Ф. 10

Тел. (02) 3116053 (од 9 до 15 часот)

Жиро сметка 3000 0000 1276 071, ЕДБ 4030 99 11 21 596,

Депонент: Комерцијална банка - Скопје,

СМ на Македонија, за СИГМА.

Учениците кои ќе испратат точни решенија на некои од задачите (од рубриците задачи, конкурсни задачи, наградна задача и задача на бројот) ќе бидат наградени со пригодна награда и нивните имиња ќе бидат објавени во СИГМА. Наградата ќе зависи од бројот на точно решени задачи. Особено ќе се вреднува решавањето на наградната задача и задачата на бројот.

Сите коментари, забелешки, Ваши предлози (статии, занимливости, задачи, работа со талентирани ученици и друго) за објавување во СИГМА, и решенија на задачите, можете да ги испратите на e-mail:

gorgim@pmf.ukim.mk

РЕДАКЦИСКИ ОДБОР

Главен и одговорен уредник:

Д-р Ѓорѓи Маркоски, Природно-математички факултет, Скопје

Уредници:

Д-р Алекса Малчески, Машински факултет, Скопје

Д-р Сава Гроздев, Бугарска академија на науки, Софија

Д-р Ристо Малчески, ФОН универзитет, Скопје

Д-р Весна Манова-Ераковиќ, Природно-математички факултет, Скопје

Д-р Слаѓана Брсаќоска, Природно-математички факултет, Скопје

Д-р Ирена Стојковска, Природно-математички факултет, Скопје

Д-р Валентина Миовска, Природно-математички факултет, Скопје

М-р Делчо Лешковски, Скопје

М-р Анета Гацовска, Природно-математички факултет, Скопје

М-р Зоран Мисајлески, Градежен факултет, Скопје

Д-р Зоран Трифунов, Велес

М-р Петар Соколоски, Природно-математички факултет, Скопје

М-р Даниел Велинов, Градежен факултет, Скопје

Д-р Бојан Прангоски, Машински факултет, Скопје

Д-р Методи Главче, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, Скопје

Зоран Штерјов, Пробиштип

Ѓорѓи Цветков, Кратово

Со мислење на Министерство за образование и наука бр. 11-914/3 од 01.03.2012 година
се одобрува употреба на СИГМА во средните училишта.

Печати: АЛФА-94 МА, Скопје. Тираж 1500 примероци.

СОДРЖИНА

Ирена Стојковска КАРИЕРНИ МОЖНОСТИ ЗА МАТЕМАТИЧАРИТЕ	1
Елена Хаџиева, Душан Петковски МАТЕМАТИКАТА ВО МАГИЈАТА, 4 дел	9
Зоран Штерјов МЕТРИЧКИ РЕЛАЦИИ ВО ТЕТИВЕН ЧЕТИРИАГОЛНИК	13
Билјана Златановска ДИНАМИКА НА ЛИНЕАРНОТО ПРЕСЛИКУВАЊЕ $f(x) = bx + c$ НА \mathbb{R}	18
XXXVII РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО МАТЕМАТИКА, 15.II-2014	24
МЕЃУНАРОДЕН МАТЕМАТИЧКИ НАТПРЕВАР КЕНГУР 2014	32
РЕШЕНИЈА НА ЗАДАЧИТЕ ОД СИГМА 104	37
РЕШЕНИЕ НА НАГРАДНАТА ЗАДАЧА ОД СИГМА 104	42
РЕШЕНИЕ НА ЗАДАЧАТА НА БРОЈОТ СИГМА 104	42
РЕШЕНИЈА НА КОНКУРСНИТЕ ЗАДАЧИ ОД СИГМА 104	43
РЕШЕНИЈА НА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ЗАДАЧИ ЗА МАТЕМАТИЧКИ НАТПРЕВАРИ	49
ТЕСТОВИ	55
НАГРАДНА ЗАДАЧА НА БРОЈОТ, СИГМА 105	61
ЗАДАЧА НА БРОЈОТ, СИГМА 105	54
КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ, СИГМА 105	54
ПОДГОТВИТЕЛНИ ЗАДАЧИ ЗА МАТЕМАТИЧКИ НАТПРЕВАРИ	56

Билјана Златановска
 Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

За парот (X, f) , X е непразно множество и $f : X \rightarrow X$ е пресликување. За дадена точка x од X , нека

$$x = x_0 = f^0(x), x_1 = f(x_0), x_2 = f(x_1) = f^2(x), \dots, x_{n+1} = f(x_n) = f^{n+1}(x) \dots$$

Низата $x_0, x_1, \dots, x_{n+1}, \dots$ се вика **траекторија** на f со почеток во x . Множеството од сите слики $f^n(x) = f(f(\dots(f(x))\dots))$ на x кои се добиваат итеративно со f се вика **орбита** на x и се означува со $orb(x) = \{z \mid z = f^n(x), n \in \mathbb{N}_0\}$. Точката x е **неподвижна** (фиксна) **точка** на пресликувањето f ако $f(x) = x$ ($orb(x) = \{x\}$). Точката x од X се вика **периодична точка** за f ако постои природен број $n > 1$ така што $f^n(x) = x$ и $f^{n-1}(x) \neq x$. Најмалиот природен број n со даденото својство се вика период на x . Во тој случај $orb(x)$ има точно n точки и $orb(x)$ се вика **периодична орбита**. Пресликувањето на точката x од X со f се нарекува **движење** или **динамика** на точката x кон $f(x)$, $f(x)$ кон $f(f(x))$ итн. Диференцната (рекурентна) равенка $x_{n+1} = f(x_n)$ определува **дискретен динамички систем** (X, f) (X е непразно множество и $f : X \rightarrow X$ е пресликување).

Линеарното пресликување на \mathbb{R} , $f(x) = bx + c$ го разгледуваме како диференцна равенка $x_{n+1} = f(x_n) = bx_n + c$. Комплетната класификација на динамиката на линеарното пресликување на \mathbb{R} , $f(x) = bx + c$ како наједноставно е неговото однесување во неподвижните точки (доколку истите постојат), како и egzистенцијата на периодични точки.

Генерално, однесувањето на пресликувањето $f(x) = bx + c$ ние можеме да го испитаме со графички и аналитички метод.

Графички метод: Во $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ се цртаат графиците на $f(x)$ и $y = x$. Пресекот на овие две ја дава неподвижната точка на пресликувањето $f(x)$. Избираме произволна точка x од x -оската и цртаме вертикална линија паралелна со y -оската до пресек со графикот на $f(x)$. Ова е првата итерација на $f(x)$. Од $f(x)$ цртаме линија паралелна со x -оската до пресек со $y = x$. Од таму се црта повторно линија паралелна со y -оската до пресек со графикот на $f(x)$, каде се добива втората итерација $f^2(x)$. Оваа процедура ја повторуваме повеќе пати (каде $f^k(x)$ е k -тата итерација на пресликувањето $f(x)$). Така се добива и орбитата на точката x , $orb(x)$. Ако со вакво цртање се доближуваме до неподвижната точка тогаш неподвижната точка игра улога на привлечна точка (атрактор или стабилна точка). Доколку се оддалечуваме од неподвижната точка тогаш неподвижната точка игра улога на одбивна точка (репелер или нестабилна точка).

Аналитички метод: Аналитичкиот метод се состои од наоѓање на апсолутната вредност на првиот извод на $y = f(x)$ (ако тој постои) во неподвижната точка:

1. Ако $|f'(x)| > 1$ тогаш x е одбивна точка;

2. Ако $|f'(x)| < 1$ тогаш x е привлечна точка.

Да се вратиме на линеарното пресликување $f(x) = bx + c$ на R .
Неподвижната точка на $f(x) = bx + c$ ја наоѓаме,

$$f(x) = x \Rightarrow bx + c = x \Rightarrow x = \frac{c}{1-b}, b \neq 1.$$


Првиот извод на $f(x) = bx + c$ е $f'(x) = b$, што повлекува дека однесувањето на линеарното пресликување $f(x) = bx + c$ на R во неподвижната точка $x = \frac{c}{1-b}, b \neq 1$ зависи од коефициентот b . Ќе разгледаме повеќе случаи:

Случај 1. За $b \neq 0$ и $c = 0$, се добива пресликувањето $f(x) = bx$ со извод $|f'(x)| = |b|$.

1. За $b > 0$ и $b \neq 1$ се добиваат два случаи каде неподвижната точка е $x = \frac{c}{1-b} = \frac{0}{1-b} = 0$.

i) За $b > 1$, $f(x) = bx$ со извод $|f'(x)| = |b| > 1$, неподвижна точка $x = 0$ е одбивна точка за сите точки од $f(x) = bx$.


Пример 1: За $f(x) = 2x$ со прв извод $|f'(x)| = 2 > 1$, неподвижната точка $x = 0$ е одбивна точка за сите точки од $f(x) = 2x$ (цртеж 1).



Цртеж 1: $f(x) = 2x$ и $orb(1), orb(-0.8)$

ii) За $0 < b < 1$, $f(x) = bx$ со извод $|f'(x)| = |b| < 1$, неподвижната точка $x = 0$ е привлечна точка за сите точки од $f(x) = bx$.

Пример 2: За со извод $|f'(x)| = \frac{1}{2} < 1$, неподвижната точка $x = 0$ е привлечна точка за сите точки од $f(x) = \frac{1}{2}x$ (цртеж 2).




Цртеж 2: $f(x)=x/2$ и $orb(4)$, $orb(-4)$

2. За $b < 0$, се добиваат три случаи каде се јавува истата неподвижна точка

$$x = \frac{c}{1-b} = \frac{0}{1-b} = 0.$$

i) За $b < -1$, $f(x) = bx$ со извод $|f'(x)| = |b| > 1$, неподвижната точка $x=0$ е одбивна точка за сите точки од $f(x) = bx$.


Пример 3: За $f(x) = -2x$ со извод $|f'(x)| = 2 > 1$, неподвижната точка $x=0$ е одбивна точка за сите точки од $f(x) = -2x$ (цртеж 3).



Цртеж 3: $f(x) = -2x$ и $orb(1)$

ii) За $-1 < b < 0$, $f(x) = bx$ со извод $|f'(x)| = |b| < 1$, неподвижната точка $x=0$ е привлечна точка за сите точки од $f(x) = bx$.


Пример 4: За $f(x) = -\frac{1}{2}x$, со извод $|f'(x)| = \frac{1}{2} < 1$, неподвижната точка $x=0$ е привлечна точка на сите точки од $f(x) = -\frac{1}{2}x$ (цртеж 4).



Цртеж 4: $f(x) = -x/2$ и $orb(2)$

iii) За $b=-1$, $f(x) = -x$ има извод $|f'(x)| = 1$. Ако ја земеме втората итерација на $f(x) = -x$, $f^2(x) = f(f(x)) = x$ забележуваме дека таа се поклопува со $f(x) = x$. Ова ни покажува дека сите точки од $f(x) = -x$, освен 0 се периодични со период 2.

3. За $b=1$ се добива $f(x) = x$, со прв извод $|f'(x)| = 1$. Ова е случај кога сите точки од правата се неподвижни (цртеж 5).




Цртеж 5: $f(x) = x$

Случај 2. За $b=0$ и $c=0$ се добива $f(x) = 0$ т.е x -оската. Овде сите точки од функцијата $f(x) = 0$ одат во 0 после првата итерација.

Случај 3. За $b=0$, $c \neq 0$ имаме $f(x) = c$ со извод $f'(x) = 0$. Неподвижна точка е $x = \frac{c}{1-b} = \frac{c}{1} = c$. Сите точки од $f(x) = c$ одат во c после првата итерација и таа е привлечна точка за сите точки од $f(x) = c$.

Пример 5: За $f(x) = -3$ имаме неподвижна точка $x = -3$. Сите точки од $f(x) = -3$ одат во $x = -3$ по првата итерација (цртеж 6).




Цртеж 6: $f(x) = -3$

Случај 4. За $b \neq 0$ и $c \neq 0$ имаме $f(x) = bx + c$ со извод $|f'(x)| = |b|$. Неподвижна точка е $x = \frac{c}{1-b} = -\frac{c}{b-1}$ за $b \neq 1$.

i) За $b > 1$ и $b < -1$, $f(x) = bx + c$ со извод $|f'(x)| = |b| > 1$, неподвижната точка $x = -\frac{c}{b-1}$ е одбивна точка за сите точки од $f(x) = bx + c$.


Пример 6: За $f(x) = 2x + 3$ со прв извод $|f'(x)| = 2 > 1$, неподвижната точка $x = -\frac{c}{b-1} = -\frac{3}{2-1} = -3$ е одбивна точка за сите точки од $f(x) = 2x + 3$ (цртеж 7).



Цртеж 7: $f(x) = 2x + 3$ и $orb(-1)$, $orb(-3.5)$

ii) За $0 < b < 1$ и $-1 < b < 0$, $f(x) = bx + c$ со прв извод $|f'(x)| = |b| < 1$, неподвижната точка $x = -\frac{c}{b-1}$ е привлечна точка за сите точки од $f(x) = bx + c$.

Пример 7: За $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$ со извод $|f'(x)| = \frac{1}{2} < 1$, неподвижната точка $x = -\frac{c}{b-1} = -\frac{-1}{\frac{1}{2}-1} = -\frac{-1}{-\frac{1}{2}} = -2$ е привлечна точка за сите точки од $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$ (цртеж 8).




Цртеж 8: $f(x) = x/2 - 1$ и $orb(4), orb(-4.5)$

iii) За $b=-1, c \neq 0, f(x) = -x + c$ со прв извод $|f'(x)| = |-1| = 1$, неподвижна точка $x = -\frac{c}{-1-1} = \frac{c}{2}$ и втора итерација $f^2(x) = f(f(x)) = f(-x + c) = -(-x + c) + c = x$. Овој случај се сведува на истиот случај како и за $f(x) = -x$, каде сите точки од $f(x) = -x + c$, освен c се периодични со период 2.

Случај 5. За $b=1, c \neq 0, f(x) = x + c$ со извод $|f'(x)| = |b| = 1$ чиј график е паралелен со $f(x) = x$. Ова е случај кога $f(x) = x + c$ и $y=x$ немаат пресечни точки и тогаш нема ниту неподвижни точки, ниту периодични точки.

Пример 10: За $f(x) = x + 3$ со извод $|f'(x)| = 1$ нема ниту неподвижни точки, ниту периодични точки (цртеж 9).



Цртеж 9: $f(x) = x + 3$

Заклучок: Од дадената анализа може да констатираме дека покомплексна слика за динамиката на линеарната функција $f(x) = bx + c$ на R ни даваат $f(x) = -x$ и $f(x) = -x + c$, каде се појавуваат и периодични точки со период 2. Како и да е, може да се заклучи дека динамиката на линеарното пресликување на R е многу едноставна.