Застапеност на пациенти со мозочен удар и рехабилитација во акутна фаза

С.Тонева Д.Василева

Факултет за медицински науки Универзитет ,,Гоце Делчев”

ВОВЕД

Терминот мозочен удар означува тешко оштетување на мозочната функција, настаната поради акутно растројство на мозочната циркулација. Најдобри резултати се добиваат ако рехабилитацијата започне што порано. Екстензивна, долготрајна терапија е наменета за корекција и ублажување на последиците од оваа болест.







МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ

Земени се статистички податоци од Центарот за Јавно Здравје во Штип. Истражувањето е спроведено за период од 3 години, а пациентите се избирани според основната дијагноза церебрален инфаркт (МКБ-10 I63) и не се вклучувани критериуми за исклучување на пациенти според настанати компликации, се со цел присуство на хомогеност во истражувањето.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Од направеното истражување, добиваме резултати кои покажуваат дека во 2015 година вкупно 54 мажи и 54 жени добиле церебрален инфаркт, во 2016 година вкупно 26 мажи и 23 жени добиле церебрален инфаркт, а во 2017 година вкупно 53 мажи и 47 жени добиле церебрален инфаркт. Вкупниот број на мажи изнесува 133, а на жени 124 што значи дека почесто се јавува кај машката популација.

ЗАКЛУЧОК

Од ова истражување можеме да заклучиме дека инциденцата на појава мозочниот удар расте линеарно со порастот на возраста , а врвот на појавата е 60-69 години. Церебралниот инфаркт е почест кај мажите , отколку кај жените.