



Флексибилни Парцијални Протези кај Деца



Дарко Кочовски

University "GoceDelcev" - Stip
Faculty of Medical Sciences, Dental Medicine

I Македонски Педодонски
Конгрес
18 - 19 Мај, 2018



Вовед

Протетскиот третман кај децата има за цел да ја врати естетиката, да го зачува просторот за идниот траен заб, да овозможи прави и правилен развој на орофацијалните структури во сите три рамнини како и да овозможи превенција од темпоромандибуларни заболувања. Целта на студијата е да се прикажат флексибилните парцијални протези како метод за протетско решение кај децата.



Материал и метод

Материјалите за оваа студија беа добиени со опсежни пребарувања од соодветната литература.

Резултати

Предностите на флексибилните парцијални протези пред се произлегуваат од нивната флексибилност и еластичност со што овозможуваат непречен раст и развој на орофацијалните структури, истот така децата неможат лесно да ги скршат. Потполно се естетски, кукичките се изработуваат од истиот флексибилен материјал децата немаат метал во устатат и не се жалат на болки при нивното носење. Протезите се биокомпактибилни и не се алергични. Имаат многу мала тежина, што децата и воопшто не ги чувствуваат како страно тело, а нивната еластичност и цврстина дозволуваат и редукција на протезната база со што се избегнува чувството на гадење кај децата.



Заклучок

Мобилните протетски надокнади во детска возраст би требало да преставуваат само привремени решенија додека да заврши растот и развојот на децата.

Користена литература

- www.dr-lopatin.ru/services/child/detskie-zubnye-protezy
- www.mydentist.ru/protezirovanie-zubov/neylonovye-protezy
- Boral P, Chowdhary S, Kumar G, Flexible Partial Denture For Unilateral Remaining Teeth By Using Wrap Around Clasp, Indian Journal of Dental Sciences 2013; 5:50-52
- Sharma A, Shashidhara H.S, A Review: Flexible Removable Partial Dentures, Journal of Dental and Medical Sciences 2014; 13:58-62
- Goiato MC, Panzarini SR, Tomiko C, Luvizuto ER: Temporary flexible immediate removable partial denture: a case report. Dentistry Today, 2008; 27:114-116.