




ЗДРУЖЕНИЕ НА ОФТАЛМОЛОЗИ НА Р.МАКЕДОНИЈА
MACEDONIAN OPHTHALMOLOGISTS SOCIETY

МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО
MACEDONIAN MEDICAL ASSOCIATION

I МАКЕДОНСКИ ОФТАЛМОЛОШКИ КОНГРЕС
СО МЕГУНАРОДНО УЧЕСТВО

I CONGRESS OF MACEDONIAN OPHTHALMOLOGISTS
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

ЗБОРНИК НА РЕЗИМЕА
BOOK OF ABSTRACTS



Охрид ,Р.Македонија, Хотел Белви
01-04. октомври 2003
Ohrid ,R.Macedonia ,Hotel Bellevue
01-04. octomber 2003

Генерален спонзор - Алкон
General sponsor - Alcon



Издавач
Македонско лекарско друштво
Здружение на офтамлози на
Р.Македонија

Publisher
Macedonian medical society
Macedonian Ophthalmologists society

За издавачот
Милица Ивановска

For the publisher
Milica Ivanovska

Главен и одговорен уредник
Златко Арнаудовски

Editor in Chief
Zlatko Arnaudovski

Секретари
Татјана Петреска Јосифова
Виолета Бучковска николовска
Дејан Ставриќ

Secretaries
Tatjana Petreska Josifova
Violeta Buckovska Nikolovska
Dejan Stavric

Технички секретари
Билјана Блажевска
Галина Димитрова
Виолета Јакимовска

Technical Secretaries
Biljana Blazevska
Galina Dimitrova
Violeta Jakimovska

Печати
Скенпоинт, Скопје

Print
Skenpoint

Тираж
400

Number of copies
400



1,beta and TNF-alfa in aqueous humor patients with uveitis and senile cataract.

METHODS: We use ELISA test.

RESULTS: Statistical analysis showed a significant difference $H=32,51, p<0.01$ in aqueous IL-6 levels; $H=27,11, p<0,01$ in aqueous IL-1 beta levels on both uveitis groups as compared to controls.

DISCUSSION: This observation suggest that cytokines may play an important role as an inflammatory mediators in uveitis.

3.03 MORBUS ВЕНСЕТ СО ИНВОЛВИРАЊЕ НА ЦЕНТРАЛНИОТ НЕРВЕН СИСТЕМ - ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ

Пијанманова-Каровска Љ¹, Барбов И², Миновски С¹.

¹Здравствен Дом Скопје, ²Клиника за неврологија Скопје, Македонија

ЦЕЛ: Morbus Behcet е идиопатска болест од групата на примарни васкулити. Тие се класифицирани според предилекционата погоденост на крвните садови. Тоа е болест на зреладултна возраст но може да се јави и во помлада возраст како што е случај кај нашиот пациент.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД: Во трудот е прикажан 28 год. пациент кај кого болеста започнала пред 3 год. со рецидивирачки афтолозен стоматит и генитални улцерации (на скротумот). Класичниот тријас бил комплетиран со појава на акутен увеит на десното око. Непосредно пред приемот на Клиника за неврологија се јавуваат и невролошки манифестијации: првични транзиторни исхемични атаки а потоа и слабост во десностраниите екстремитети (десностррана хемипареза).

РЕЗУЛТАТИ: Направени се неопходните клинички и параклинички инвестигации, од кои најважна е магнетната резонанца на мозокот која покажа инволвираност и на централниот нервен систем, со лезии во пределот на мезенцефалон и базалните ганглии лево. Со соодветна кортикостероидна и имуносупресивна терапија се постигна задоволителна ремисија.

ДИСКУСИЈА: Кога ќе се појават симптоми поради зафаќање на повеќе органски системи, треба да се мисли на полисистемска болест, односно васкулитис. Во зависност од тоа кои системи се повеќе погодени синдромите ги добиле и своите имиња. Кај М. Бехцет е класичен тријасот: афти и улцерации во устата и гениталиите и акутен увеит, а ако се јават невролошки манифестијации како кај нашиот пациент, прогнозата е многу полоша.

3.04 FUCHS HETEROCHROMIC IRIDOCYCLITIS CASE REPORT

Jovovic Pepic B.; Jaric Djordjevic V.

Eye clinic of KC Podgorica, Montenegro, RSCG

3.05 ЕТИОЛОГИЈА НА ПРЕДНИ УВЕИТИ ВО ШТИПСКА ОКОЛИЈА

Икономова Љ., Челева Марковска В.*, Шалева А., Газейов С

Медицински Центар, Штип, Македонија

Клиника за очни болести, Скопје, Македонија

ЦЕЛ: Етиолошка дијагноза на предни увеити

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД: Испитувани се 103 амбулантно и хоспитално лекувани пациенти во тек на јуни 1998 до јуни 2003 година.

РЕЗУЛТАТИ: Кај 10 случаја дијагностициран е анкилозантен спондилит, 3 случаја на Рајтерова болест, 1 сл. на псоријаза, 1 сл. на Кронова болест, преден увеит побрзан со ХЛА-Б27 а беззафаќање 8 сл., 6 сл. јувенилен артрит, 3 сл. на



хетерохромен иридоциклит на Фукс, 3 сл. на Поснер-Шлосман, 30 сл. на факоген увеит, 5 сл. на преден увеит поврзан со фокалози и идиопатски 32 сл.

ДИСКУСИЈА: најчест етиолошки ентитет од предните увеити е факогениот увеит (28,4%), потоа следуваат увеитите поврзани со ХЛА-Б27 + (28,1%). Етиолошки е потврдена дијагнозата кај 71/103 (70%) од пациентите.

3.06 КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА НА УВЕИТ КАЈ МОРБУС БЕЦХЕТ СО ЦИКЛОСПОРИН И КОЛЦИХИН

Челева Марковска В, Димишрова Г.

Клиника за очни болести, Скопје, Р.Македонија

ЦЕЛ: Да се следат терапевтските ефекти и несакани дејства кај пациенти со Морбус Бецхет третирани со комбинирана терапија на циклоспорин и колцихин.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД: 8 пациенти (6 мажи и 2 жени) со очни компликации кои биле лекувани помеѓу 1994-2003г. Сите пациенти биле лекувани првично само со циклоспорин, а потоа е додаден колцихинот (1 мг.) Испитувани биле несаканите дејства на лековите и бројот на рецидивантни атаки пред комбинираната терапија и после. Следена е видната острота за една до 2 години.

РЕЗУЛТАТИ: број на очни атаки за 6 месеца само со циклоспоринска терапија од 3+-0,3 се намали на 2,1+-0,3 после 6 месец, односно 1,9+-0,5 во 12 месец после комбинираната терапија. Несакани дејства на комбинираните лекови беа забележани во вид на ренална дисфункција кај 62%, гастроинтестинални симптоми кај 50%, хепатална дисфункција кај 12,5%, неуролошки симптоми кај 12,5% и хипертензија кај 12,5%.

ДИСКУСИЈА: Оваа терапија покажа забележителен ефект за превенирање на очните атаки кај Морбус Бецхет. Како несакани ефекти, се забележани реналната дисфункција и диареа.

4.01 ИНТРАОКУЛАРЕН ПРИТИСОК КАЈ ПАЦИЕНТИ СО DIABETES MELLITUS

Пејковски Б, Пејковска Р, Сојировска Л.

Служба за очни болести

Служба за инфективни болести - Медицински Центар Битола Р.Македонија

ЦЕЛ : Diabetes mellitus е болест во постојан пораст. Со нејзиното современо лекување продолжен животниот век на овие пациенти и затоа се поприсутни нејзините компликации. Од офтамоловски интерес е зачестеноста на дијабетичната ретинопатија која заедно со глаукомот е се почеста причина за редуцирање на видот. Светските испитувања покажуваат поголема застапеност на глаукомот кај болните од дијабет во однос на пациентите кои немаат дијабет. Испитување на корелацијата меѓу дијабети: на ретинопатија и глауком.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ: Нашиот материјал обработува пациенти од 35-75 годишна возраст кои се прегледани во амбулантата на очно одделение - Битола и тоа 175 очи кај пациенти со дијабет од кои 135 имаат дијабетична ретинопатија и 330 очи кај пациенти без дијабет како контролна група.

Користен е офтамоскоп и биомикроскоп за преглед на очно дно и тоно-