



Алвеоларна презервација пред поставување на дентални импланти - приказ на случај

ВОВЕД

Денталните екстракции често резултираат со димензионални промени кои со тек на времето доведуваат до коскена ресорпција. Зачувување на алвеоларната коска по вадењето на забите има големо значење со цел да се постигнат естетските и функционални резултати. После одреден временски период, кога потполно е заздрано местото на екстракција, како една од можните терапевтски процедури е поставување на имплант. Препорачано е местото на екстракција да биде претходно подготвено со аугментација, што може да биде направена со различни видови на коскени супституенти.




Tooth Extraction



Bone Graft Placed




Membrane In Place



Suturing of Gum Tissue



Healed Extraction Site



Dental Implant Placed





Implant Crown Attached

ЦЕЛ

Цел на оваа презентација е да се прикаже примената на коскени супституенти за аугментација на алвеоларни гребени, нивно заздравување како и поставување и остеоинтеграција на денталниот имплант на местото на екстракцијата.

Материјал и метод

Пациентката на 51 годинишна возраст, на клинички преглед се воочува индикација за екстракција на заб (46) од пародонтолошки причини. После екстракцијата на (46) следеше аугментација со коскен супституент од говедско потекло. Поставувањето на денталниот имплант беше шест месеци после екстрахирањето на забот и поставувањето на графтоот. Дополнителни четири месеци од поставувањето на имплантот, беше изработена протетска надоградба.



Заклучок

Примената на коскени супституенти за алвеоларна аугментација и поставување на дентален имплант ги препорачуваме како можна импланто – протетска реставрација, со чија помош ќе ги зачуваме соседните заби од стружење, а финалното решение кое ќе го добиеме ќе биде функционално, естетско и долготрајно.