Профилакса на длабоки венски тромбози со ниско молекуларен хепарин кај пациенти со фрактура на фемур, хоспитализирани и оперирани во Ортопедското одделение во Штип

Витларова Ј., Камчев Н., Иванова Л., Киров Л., Шишков З.

РЕ Трансфузиологија, РЕ Ортопедија со трауматологија, Медицински центар, Штип, Р. Македонија

ЦЕЛ

Реално да се утврди инциденцијата на длабоки венски тромбози кај пациенти со фрактури на фемурот хоспитализирани и оперирани во Ортопедското одделение во Штип, а профилактички треирани со нискомолркуларни дози на хепарин.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ

•Во изминатите две години оприрани се 30 пациенти за две години. Една група пациенти третирани се со Frahepan 3000IE/0,3 m l на еднаш дневно во тек на 7 дена и втора група пациенти третирани со Fraxiparine 2850 IE/0,3ml.

•Првата доза беше дадена 2-12 часа пред операција заради неговиот подолг полуживот, а кај високоризичните имобилизирани болни и порано.

РЕЗУЛТАТИ

Во изминатите две години оперирани се 30 пациенти за две години. Една група пациенти третирани се со Frahepan 3000IE/0,3 m l на еднаш дневно во тек на 7 дена и втора група пациенти третирани со Fraxiparine 2850 IE/0,3ml. Првата доза беше дадена 2-12 часа пред операција заради неговиот подолг полуживот, а кај високоризичните имобилизирани болни и порано.

ЗАКЛУЧОК

Препорачуваме редовно користење на нискомолекуларен хепарин во профилакса на длабоки венски тромбози кај болни со фрактури на колкот.