

Терапија со еритроцитни концентрати на болни со карцином на белите дробови и секундарна анемија во Дневната трансфузиолошка болница во Штип

Камчев Н., Камчева М. Витларова Ј., Икономовска Л.
РЕ Трансфузиологија, Медицински центар, Штип, Р. Македонија

ЦЕЛ

Да се прикаже бројот на болни со карцином на белите дробови и секундарна анемија хоспитализирани и трансфундирани со Еритроцитни концентрати во Дневната трансфузиолошка болница во Штип.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ

Болните со карцином на белите дробови се дијагностицирани и лекувани во Медицински центар во Штип, Клиниката за пулмологија и Клиниката за тораковаскуларна хирургија во Скопје. За корекција на анемичниот синдром се хоспитализирани во Дневната трансфузиолошка болница во Штип, а се трансфундирани со Еритроцитни концентрати.

РЕЗУЛТАТИ

Во изминатите две години и 5 месеци хоспитализирани се 149 пациенти со малигноми. Од нив 27 (*18,12%)(се болни од карцином на белите дробови. Кај сите постои и секундарен емемиски синдром. Кога нивото на хемоглобинот е испод 70 д/л трансфундиравме по 2 дози еритроцитни концентрати.

ЗАКЛУЧОК

Болните во поасниот стадиум од болеста разиваат анемичен синдром. Загружува податокот дека болните со карцином на белите дробовои од година во година се зголенува.

