

Анемии по породување во РЕ Гинекологија со акушерство во Медицински центар во Штип

Јанкуловска С. Витларова Ј. Камчев Н.

РЕ Гинекологија со акушерство-Медицински центар, Штип, Република Македонија

ЦЕЛ

Да се прикаже бројот на родилки со анемија за период од три години во РЕ Трансфузиологија со акушерство во Медицински центар во Штип и нивниот третман со трансфузија на Ер концентрати и и.в. апликација на амп. Venofer.

РЕЗУЛТАТИ

Кај родилките третирани со трансфузија на еритроцитни концентрати (1-3 еритроцитни единици имаше пораст на Hg до 110 gr/l. Кај родилките третирани со i.v. Апликација на Амр. Venofer во подолг временски период вредностите на хемоглобинот пораснаа до 110 gr/l.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ

во изминатите три години во РЕ Гинекологија со акушерство се породени вкупно 3609 пациентки.

Од нив кај е утврдено дека се има појавено анемичен синдром, поради што е започнато лекување со интравенозна примена на Амр. Venofer и трансфузија на еритроцитни концентрати, во зависност од клиничката состојба и хематолошките лабораториски параметри.

ДИСКУСИЈА

Анемијата е резултат на намалувањето на железото кај мајката бидејќи го користи плодот во текот на последниот триместар од бременоста, како и поради губиток на крв при самиот акт на породување. Терапијата со еритроцитни концентрати и Амр. Venofer даваат задоволителни резултати.