



Употреба на антибиотици за само-медикација кај медицински образовани лица кои имаат ендодонтска терапија

9ти конгрес со меѓународно учество
на МСД, Охрид, Р.С.Македонија
15-18.09.2022

Верица Тонева Стојменова, Соња Роголева Ѓуровски, Наташа Лонгурова, Александра Тонева Николова, Ивона Ковачевска

Вовед:

Се почесто присутната само-медикација кај популацијата, посебно со земање на лекови и препарати кои навидум се безазлени претставуваше иницијација за поставување на целта на оваа студија: да се направи процена на само-медикацијата со антибиотици кај пациентите на кои им требаат стоматолошки услуги. Исто така, предмет на испитување е и да се верифицираат кои антибиотици најчесто се користат, како и да се процени улогата на образованието при само - медикацијата.

Цел:

Целта на оваа спроведена студија е да се добие јасна претстава за употребата на антибиотиците кај пациенти со медицинско образование кои имаат ендодонтски третман.

Материјали и методи:

Во испитувањето беа вклучени 40 пациенти со медицинско образование, на возраст од 17- 74 години, по случаен избор, од обата пола, кои заради стоматолошки услуги се јавиле во три стоматолошки ординации на ФМН при Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип. На сите нив им беше дистрибуиран анонимен анкетен прашалник за само-медикација, кои препарати ги користат, извор за медикаментите и слично.

АНКЕТЕН ЛИСТ

1. Пол? мжк ж
2. Година _____
3. Образование
основно / средно / високо
4. Место на живеење
Град / Село
5. Дали користите антибиотици?
Да / Не
6. Дали сте алергични на антибиотици?
Да / Не
7. Кои антибиотици најчесто ги користите при промени во устата? (заокружете)
амоксицилин, вибрамицин, цефалексин, еритромицин, други (небој)
8. Дали при промени во устата, веднаш (уште истиот ден) кога ќе ги забележите промените, се јавуваат кај:
а) вашиот стоматолог или
б) пробувате во домашни услови да си помогнете на себе?
10. Дали користите антибиотици, бидејќи вашиот стоматолог ви ги препорачал?
Да / Не |
11. Дали сугерираат на вашиот стоматолог, кои антибиотици најдобро ви делуваат за да ви ги прелираат?
Да / Не
12. Дали користите антибиотици по препорака на некој ваш близок?
Да / Не
13. Дали земате антибиотици кога според ваша проценка ви се потребни?
Секогаш, Често, ретко, никогаш
14. Дали го користите истиот антибиотик кој ви го препорачал вашиот стоматолог претходно, кога ќе ви се јават истите симптоми повторно?
Да / Не
15. Кога земате антибиотици на ваша рака, без консултација со стоматолог?
(заокружете)
а) Забоболка,
б) Недефинирана болка во устата,
в) Болка во главата,
г) Оток во устата,
д) Црвенило во устата,
е) Присуство на непријатен мирис во устата,
ж) Гној во устата,
з) Ранчки во устата,
и) Растење на млечен-траен заб,
к) други промени (напишете) _____
16. Дали по употребата на антибиотици, состојбата ви се подобрува?
Секогаш / Понекогаш / Никогаш
17. Колку долго земате антибиотици?
1-3 дена / 3-5 дена / 5-7 дена / Додека не поминат симптомите / Додека не ги побараште / Додека вашиот стоматолог ви препорачал
18. При земањето на антибиотици во текот на денот, дали забелекувате при земањето на својата таблета да е на ист временски интервал?
Да / Не
19. Што правите кога ќе процените да земете една доза на антибиотик?
а) ништо
б) земете дупла доза од антибиотикот
в) ја земете дозата и продолжуваат по нов редослед на сметане на користење
г) ја земете дозата и продолжуваат по истиот редослед
20. При намалење на ефекти од одреден антибиотик, што правите?
а) земете дупла доза од одреден антибиотик
б) земете доза од друг антибиотик
в) не правите ништо
21. Дали заете кој антибиотик најдобро ви делува на вас, при промени во устата?
Да / Не


ПОТПИС НА ИСПИТАНИКОТ: _____
(непотпишување на анкетата се смета за непозволена однесување и информациите не се користат во извештајот на дипломска работа)

Резултати:


Резултатите покажаа дека:

- самомедикацијата е застапена во првата група и тоа: 16 лица (40%) одговорија позитивно, а преостанатите 60% (24 лица) одговорија негативно.

Графикон за приказ на честота на земање на антибиотик




застапеност на антибиотиците




Причина за само-медикација

Причина за само-медикација	Бројна застапеност	Процентуал на застапеност (%)
Забоболка	31	31%
Недефинирана болка во устата	2	2%
Главоболка	21	21%
Отток во устата	10	10%
Црвенило	0	0%
Присуство на непријатен мирис во устата	0	0%
Гној во устата	11	11%
Ранчки во устата	3	3%
Растење на млечен-траен заб	4	4%
Поради ни една причина (бидејќи не)	24	24%

застапеност по пол



Графички приказ на застапеност на испитаници од село и од град



Заклучок:

Без разлика на карактеристиките на антибиотиците како и нивната делотворност на инфекциите во човечкиот организам, во одредена терапевска доза, во исто време, можат да предизвикаат и многу несакани проблеми, кои во екстремни случаи може да завршат и летално, нивната рационална употреба и контрола всушност е целосно оправдана.