

Преваленца и фактори на ризик поврзани со гестациски дијабетес мелитус кај бремени жени



Блерта Локмани¹, Љубица Аџи-Андов^{1,2}

¹Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Северна Македонија

² Специјализирана болница по гинекологија и акушерство „Д-р Органџиски“, Штип, Северна Македонија

ВОВЕД

Гестацискиот дијабетес мелитус (ГДМ) е нарушување на гликозната толеранција кое се јавува за време на бременоста. Тој е поврзан со зголемен мајчин и фетален морбидитет, како и долгорочни здравствени ризици. Целта на оваа студија беше да се утврди преваленцата на ГДМ и да се идентификуваат ризик -факторите кај бремени жени.

МЕТОДОЛОГИЈА

- Тип на студија : Крос -секциска
- Број на испитанички : 95 бремени жени
- Гестациска возраст : 18–32 недели
- Возраст на испитанички : >18 години
- Тестирање : Орален гликоза -толеранс тест (OGTT) со 75 грама гликоза
- Инструмент : Стандарден прашалник со три секции:
 - о Демографски податоци
 - о Медицинска историја
 - о Начин на живот и исхрана

ФАКТОРИ НА РИЗИК

- Возраст: 26 –30 години
- Семејна историја на дијабетес
- Прекумерна тежина за време на бременоста
- Ниска физичка активност
- Внес на шеќер преку пијалоци

РЕЗУЛТАТИ

Параметар	Процент (%)
Преваленца на ГДМ	33,7% (32 жени)
Возрасна група 26–30 години	45,3%
Позитивна семејна историја	40%
Прекумерна телесна тежина	26,3%
Редовна/честа консумација газирани пијалоци	65,3%
Физичка активност (редовна)	само 10,5%

ЗАКЛУЧОК

Стапката на ГДМ е значително висока (33,7 %) кај испитаните жени. Редовниот скрининг за ГДМ треба да биде дел од рутинската пренатална грижа , особено кај жени со идентификувани ризик -фактори. Потребна е едукација за здрав начин на живот за време на бременоста.